

DEFLOVET® CLASIFICACION FARMACOLÓGICA

Rubefaciente

FORMA FARMACEUTICA: Pomada

Uso veterinario



FORMULA: Cada 100 g contiene:

Salicilato de metilo	1.2 g
Mentol	1.2 g
Aceite de pino	1.7 g
Alcanfor	1.7 g
Vehículo c.s.p	100.0 g

DESCRIPCIÓN:

La combinación de tres medicamentos de origen natural permite que **Deflovet® Pomada** sea seguro y ser utilizado sin restricción en las especies indicadas. Está indicado como tratamiento coadyuvante en procesos inflamatorios causados por traumas y/o procesos degenerativos como artritis entre otros.

FARMACODINAMIA:

Deflovet® Pomada, contiene Salicilato de metilo, un éster que se emplea principalmente como agente aromatizante y posee la característica de absorberse a

través de la piel; se convierte en ácido salicílico que funciona como analgésico. Mentol es un alcohol secundario saturado que se encuentra en los aceites de menta. Posee un efecto refrescante sobre mucosas. Tiene propiedades antipruriginosas y antisépticas.

El Aceite de pino, posee propiedades antisépticas, balsámicas expectorantes, antineurálgicas, antirreumáticas e insecticidas. Tiene un efecto estimulante sobre la circulación y se emplea para aliviar dolores reumáticos. El Alcanfor se utiliza como bálsamo principalmente. Es rápidamente absorbido por la piel que causa una sensación de enfriamiento similar a la del mentol actuando como un anestésico local. Posee propiedades antimicrobianas.

FARMACOCINÉTICA:

La combinación de los tres componentes naturales facilita su absorción por la piel y se complementan para desinflamar y aliviar los procesos inflamatorios causados por traumas fuertes. Su alta capacidad para absorberse hace que **Deflovet® Pomada** sea un medicamento efectivo.

INDICACIONES:

Deflovet® Pomada es útil como coadyuvante en procesos inflamatorios causados por traumas, torceduras, artritis y contusiones. Por sus componentes produce una acción rápida y de fácil reabsorción. En infecciones de glándula mamaria ayuda a desinflamar las ubres como tratamiento externo.

ESPECIE DESTINO:

Bovinos, equinos, caprinos y caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica

FORMA DE USO:

Aplicar sobre las áreas afectadas, dar un masaje durante algunos minutos. Repetir la aplicación 2 o 3 veces al día.

DOSIS RECOMENDADA:

Aplicar la cantidad suficiente cubriendo el área afectada, tres veces al día hasta ver mejoría.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede causar salivación excesiva al momento de ser lamido.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

TIEMPO DE RETIRO:

No aplica.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

PRESENTACIONES:

Envases de 100 g, 400 g

REGISTROS SANITARIOS:

Guatemala GT41-14-12-3967

Nicaragua 10799



Producto Centroamericano hecho en

Guatemala por Laboratorios Vet S.A

PBX:(502)22458700

info@laboratoriosvet.com,

www.laboratoriosvet.com